



PIGLOW

Questionnaire: Porcs en post-sevrage

Bureau

La première partie des questions (Bureau) doit être complétée à l'endroit où les données nécessaires sont accessibles.

Pour l'évaluation proprement (à partir de la section suivante) il est recommandé de le réaliser au moins une heure après avoir nourri les animaux.

Gestion de l'exploitation

Si vous avez déjà complété cette partie par le passé, vous verrez les réponses fournies antérieurement pour certaines questions. Merci de vérifier que ces réponses sont toujours correctes et de les modifier si nécessaire.

Date de l'évaluation

Quel est le nombre total de porcs en post-sevrage à la ferme?

Votre ferme, est-ce qu'elle est biologique?

- Ja
 Nee

Quelle(s) race(s) porcine(s) avez-vous sur votre ferme?

Quel est le taux de pertes (%) en post-sevrage (sur base annuelle)?

Quel est l'âge au sevrage?

(1 optie aanduiden)

- < 28 jours
 28-39 jours
 40-45 jours
 46-50 jours
 au moins 50 jours

Quel est l'âge à l'abattage (en jours)?

Votre nom (ou description) pour le bâtiment

Le but de ce nom est de faire la distinction entre vos propres bâtiments si vous en avez plusieurs.

Quel est le mode de distribution de l'aliment?

(1 option à sélectionner)

- à volonté
- rationné

Quel type de distributeur d'aliment est utilisé?

(1 option à sélectionner)

- monoplace
- plusieurs places

Quel type d'aliment est utilisé?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options

(Plusieurs options possibles)

- alimentation sèche
- alimentation sèche humidifiée
- alimentation humide (soupe)

Combien de temps s'est écoulé entre le dernier repas et cette évaluation?

(1 option à sélectionner)

- moins d'1h
- environ 1h
- plus d'1h
- sans objet (à volonté)

Les porcs ont-ils la queue coupée?

(1 option à sélectionner)

- Non
- Oui
- Oui, certains porcelets

Les porcs sont-ils castrés?

(1 option à sélectionner)

- Non (mâles entiers)
- Oui (castration chirurgicale)
- Oui (immunocastration)

Certains des porcs portent-ils un anneau nasal?

- Oui
- Non

Quel(s) type(s) de sol est utilisé dans la partie intérieure du bâtiment?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options
(Meerdere opties mogelijk)

- caillebotis intégral
- caillebotis partiel
- sol bétonné (sans paille)
- sur litière profonde
- sol bétonné avec un peu de paille
- terre
- autre

Quel(s) type(s) de sol est utilisé dans la partie extérieure du bâtiment?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options
(Meerdere opties mogelijk)

- caillebotis intégral
- caillebotis partiel
- sol bétonné (sans paille)
- sur litière profonde
- sol bétonné avec un peu de paille
- terre/herbe
- autre

Quel(s) type(s) d'enrichissement est proposé aux animaux à l'intérieur?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options
(Meerdere opties mogelijk)

- paille/fourrage
- bois fixe
- bois libre
- toile de jute
- chaîne
- jouets attachés (par une chaîne ou une barre)
- jouets libres
- terre
- autre
- aucun

Quel(s) type(s) d'enrichissement est proposé aux animaux à l'extérieur?

Vous pouvez sélectionner plusieurs options
(Meerdere opties mogelijk)

- paille/fourrage
- bois fixe
- bois libre
- toile de jute
- chain
- jouets attachés (par une chaîne ou une barre)

- jouets libres
- terre
- herbe
- bauge
- autre
- aucun

Quel type de logement avez-vous dans cette unité?

(1 optie aanduiden)

- bâtiment avec courette
- cabannes (mobiles)

Y a-t-il des endroits de la zone extérieure rarement utilisés?

- Ja
- Nee

Observez-vous des signes de coup de soleil chez les porcelets en post-sevrage au cours de l'année?

Cela se produit sur des porcs de couleur claire, au niveau des parties du corps exposées (arrière-train, oreilles, flancs). Les signes de coups de soleil sont des **rougeurs**, des **oedèmes** et parfois des **croûtes** et de la peau qui **pèle**.

(1 optie aanduiden)

- Oui
- Parfois
- Non

Quel est l'âge moyen (en jours) des porcelets en post-sevrage que vous comptez évaluer?

Observations de groupe

1/5

Si vous avez < 50 porcelets, évaluez-les tous. Si vous avez > 50 porcelets, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases différentes (si possible).

Évaluez tous les animaux des loges sélectionnées. Veillez à sélectionner des loges distribuées équitablement dans le bâtiment de façon à assurer un échantillon représentatif.

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez quelques minutes que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro d'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les groupes sont évaluées
- observation du 1er groupe
- observation du 2e groupe
- observation du 3e groupe

- observation du 4e groupe
- observation du 5e groupe

Les porcelets, sont-ils dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
- Nee

Combien de porcs en post-sevrage sont observés pour cette évaluation?

Observez la position des porcs dans la case.

A. regroupés ou entassés (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

B. largement dispersés dans le cas, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de porcs qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, toile de jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

- Ja
- Nee

Combien de porcs sont trop petits/beaucoup plus petits que les autres porcs dans le groupe? (utiliser le bouton +)

1/3 plus petit que le **porc moyen** dans cet enclos

Combien de porcs présentent une respiration difficile?

Notez le temps (en secondes) que met le premier porc à vous approcher et vous toucher (après être entré dans l'enclos). Si aucun porc ne vous touche dans les 60 secondes, terminez le test et passez à la question suivante.

Pour plus d'informations sur cette question, voir l'icône "i".

Avant de commencer l'évaluation, vous devez entrer dans la case et en faire le tour pour vous assurer que tous les animaux vous voient. Ne démarrez pas le chrono avant de vous être immobilisé.

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
 Nee

Combien de porcs sont couverts de fèces ou de déjections sur = 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc en plein air** sali de terre ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins).

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes):

B. au moins 15 écorchures d'un même côté:

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles:

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue

C. des signes d'irritation cutanée ou de parasites:

Combien de porcs présentent une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher.

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

- Ja
- Nee

2/5

Si vous avez < 50 porcelets, évaluez-les tous. Si vous avez > 50 porcelets, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases différentes (si possible).

Évaluez tous les animaux des loges sélectionnées. Veillez à sélectionner des loges distribuées équitablement dans le bâtiment de façon à assurer un échantillon représentatif.

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez quelques minutes que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro d'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les groupes sont évaluées
- observation du 1er groupe
- observation du 2e groupe
- observation du 3e groupe
- observation du 4e groupe
- observation du 5e groupe

Les porcelets, sont-ils dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
- Nee

Combien de porcs en post-sevrage sont observés pour cette évaluation?

Observez la position des porcs dans la case.

A. regroupés ou entassés (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

B. largement dispersés dans la case, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de porcs qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, toile de jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

Ja

Nee

Combien de porcs sont trop petits/beaucoup plus petits que les autres porcs dans le groupe? (utiliser le bouton +)

1/3 plus petit que le **porc moyen** dans cet enclos

Combien de porcs présentent une respiration difficile?

Notez le temps (en secondes) que met le premier porc à vous approcher et vous toucher (après être entré dans l'enclos). Si aucun porc ne vous touche dans les 60 secondes, terminez le test et passez à la question suivante.

Pour plus d'informations sur cette question, voir l'icône "i".

Avant de commencer l'évaluation, vous devez entrer dans la case et en faire le tour pour vous assurer que tous les animaux vous voient. Ne démarrez pas le chrono avant de vous être immobilisé.

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

Ja

Nee

Combien de porcs sont couverts de fèces ou de déjections sur = 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc en plein air** sali de terre ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins).

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la

peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes):

B. au moins 15 écorchures d'un même côté:

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles:

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue

C. des signes d'irritation cutanée ou de parasites:

Combien de porcs présentent une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher.

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

- Ja
 Nee

3/5

Si vous avez < 50 porcelets, évaluez-les tous. Si vous avez > 50 porcelets, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases différentes (si possible).

Évaluez tous les animaux des loges sélectionnées. Veillez à sélectionner des loges distribuées équitablement dans le bâtiment de façon à assurer un échantillon représentatif.

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez quelques minutes que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro d'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les groupes sont évaluées
 observation du 1er groupe
 observation du 2e groupe

- observation du 3e groupe
- observation du 4e groupe
- observation du 5e groupe

Les porcelets, sont-ils dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
- Nee

Combien de porcs en post-sevrage sont observés pour cette évaluation?

Observez la position des porcs dans la case.

A. regroupés ou entassés (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

B. largement dispersés dans le cas, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de porcs qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, toile de jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

- Ja
- Nee

Combien de porcs sont trop petits/beaucoup plus petits que les autres porcs dans le groupe? (utiliser le bouton +)

1/3 plus petit que le **porc moyen** dans cet enclos

Combien de porcs présentent une respiration difficile?

Notez le temps (en secondes) que met le premier porc à vous approcher et vous toucher (après être entré dans l'enclos). Si aucun porc ne vous touche dans les 60 secondes, terminez le test et passez à la question suivante.

Pour plus d'informations sur cette question, voir l'icône "i".

Avant de commencer l'évaluation, vous devez entrer dans la case et en faire le tour pour vous assurer que tous les animaux vous voient. Ne démarrez pas le chrono avant de vous être immobilisé.

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
 Nee

Combien de porcs sont couverts de fèces ou de déjections sur = 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un porc en plein air sali de terre ou de boue (les jours de chaleur) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins).

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:
A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes):

B. au moins 15 écorchures d'un même côté:

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:
A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles:

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue

C. des signes d'irritation cutanée ou de parasites:

Combien de porcs présentent une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher.

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

- Ja
 Nee

4/5

Si vous avez < 50 porcelets, évaluez-les tous. Si vous avez > 50 porcelets, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases différentes (si possible).

Évaluez tous les animaux des loges sélectionnées. Veillez à sélectionner des loges distribuées équitablement dans le bâtiment de façon à assurer un échantillon représentatif.

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez quelques minutes que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro d'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les groupes sont évaluées
 observation du 1er groupe
 observation du 2e groupe
 observation du 3e groupe
 observation du 4e groupe
 observation du 5e groupe

Les porcelets, sont-ils dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
 Nee

Combien de porcs en post-sevrage sont observés pour cette évaluation?

Observez la position des porcs dans la case.

A. regroupés ou entassés (plus de 50% des porcs)

- Ja
 Nee

B. largement dispersés dans le cas, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

- Ja
 Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de porcs qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, toile de jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

Ja

Nee

Combien de porcs sont trop petits/beaucoup plus petits que les autres porcs dans le groupe? (utiliser le bouton +)

1/3 plus petit que le **porc moyen** dans cet enclos

Combien de porcs présentent une respiration difficile?

Notez le temps (en secondes) que met le premier porc à vous approcher et vous toucher (après être entré dans l'enclos). Si aucun porc ne vous touche dans les 60 secondes, terminez le test et passez à la question suivante.

Pour plus d'informations sur cette question, voir l'icône "i".

Avant de commencer l'évaluation, vous devez entrer dans la case et en faire le tour pour vous assurer que tous les animaux vous voient. Ne démarrez pas le chrono avant de vous être immobilisé.

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

Ja

Nee

Combien de porcs sont couverts de fèces ou de déjections sur = 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un **porc en plein air** sali de terre ou de **boue** (les **jours de chaleur**) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins).

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes):

B. au moins 15 écorchures d'un même côté:

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles:

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue

C. des signes d'irritation cutanée ou de parasites:

Combien de porcs présentent une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher.

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

- Ja
 Nee

5/5

Si vous avez < 50 porcelets, évaluez-les tous. Si vous avez > 50 porcelets, évaluez au moins 50 animaux provenant d'au moins 2 cases différentes (si possible).

Évaluez tous les animaux des loges sélectionnées. Veillez à sélectionner des loges distribuées équitablement dans le bâtiment de façon à assurer un échantillon représentatif.

Pour chaque case, vous pouvez choisir d'évaluer les animaux à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de l'endroit où la visibilité est la meilleure. Avant de commencer l'observation, attendez quelques minutes que les animaux du groupe s'habituent à votre présence.

Numéro d'observation:

(1 optie aanduiden)

- toutes les groupes sont évaluées

- observation du 1er groupe
- observation du 2e groupe
- observation du 3e groupe
- observation du 4e groupe
- observation du 5e groupe

Les porcelets, sont-ils dans ce groupe depuis au moins 14 jours?

- Ja
- Nee

Combien de porcs en post-sevrage sont observés pour cette évaluation?

Observez la position des porcs dans la case.

A. regroupés ou entassés (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

B. largement dispersés dans le cas, sur leurs flancs (plus de 50% des porcs)

- Ja
- Nee

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui:

A. halètent/respirent rapidement:

B. tremblent:

Notez le nombre de porcs qui utilisent le matériel d'enrichissement dans cette case.

Veillez à prendre en compte les options que vous avez sélectionnées auparavant : paille/fourrage, bois fixe, bois mobile, toile de jute, chaîne, jouets attachés (par une chaîne ou une barre), jouets libres, terre.

Certains animaux du groupe pourraient-ils avoir des difficultés à accéder à l'eau potable de bonne qualité à certains moments?

Cela pourrait être dû à des **facteurs physiques** (par exemple, pas assez d'abreuvoirs) ou à des **facteurs sociaux** (par exemple, le risque d'agression) qui entravent l'accès.

- Ja
- Nee

Combien de porcs sont trop petits/beaucoup plus petits que les autres porcs dans le groupe? (utiliser le bouton +)

1/3 plus petit que le **porc moyen** dans cet enclos

Combien de porcs présentent une respiration difficile ?

Notez le temps (en secondes) que met le premier porc à vous approcher et vous toucher (après être entré dans l'enclos). Si aucun porc ne vous touche dans les 60 secondes, terminez le test et passez à la question suivante.

Pour plus d'informations sur cette question, voir l'icône "i".

Avant de commencer l'évaluation, vous devez entrer dans la case et en faire le tour pour vous assurer que tous les animaux vous voient. Ne démarrez pas le chrono avant de vous être immobilisé.

Observez-vous des signes de déjections liquides dans la case (sur le sol ou les murs)?

- Ja
 Nee

Combien de porcs sont couverts de fèces ou de déjections sur = 50% de la surface sur un côté du corps?

Attention, ce paramètre ne doit pas être confondu avec la saleté: un porc en plein air sali de terre ou de boue (les jours de chaleur) est normal et n'indique pas forcément un problème de bien-être.

Comptez (en utilisant le bouton +) le nombre de porcs qui présentent un mauvais état général (nécessitant des soins).

Il s'agit des animaux qui sont visiblement en souffrance, malades, ayant besoin de soins pour éviter des complications, indifférents ou apathiques (pas alertes, ne répondent pas aux stimuli), isolés du groupe (quand ils sont couchés, debout, occupés à manger), avec des yeux ternes ou cernés, les oreilles ou le groin bleu/rouge, la peau pâle, une respiration rapide et les animaux avec une déformation importante ou une hernie (plus grande que la distance entre l'hernie et le sol).

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:

A. une ou plusieurs blessure(s) de plus de 5 cm (flancs, pattes):

B. au moins 15 écorchures d'un même côté:

Comptez (utilisez le bouton +) le nombre de porcs qui présentent:

A. une ou plusieurs lésion(s) aux oreilles:

B. une ou plusieurs lésion(s) à la queue

C. des signes d'irritation cutanée ou de parasites:

Combien de porcs présentent une boiterie clairement visible?

Boiterie clairement visible: de l'animal qui réduit visiblement le poids qu'il porte sur une patte jusqu'à l'animal qui n'est plus capable de marcher.

Est-ce que vous avez entendu des éternuements ou des toux dans cette groupe lors de cette évaluation?

- Ja
- Nee

Remarques

Veillez indiquer toute information complémentaire qui pourrait être **utile** à l'**interprétation** des résultats de l'évaluation (par exemple: vague de chaleur, passage de maladie, ...).

Fin de l'évaluation

Veillez confirmer que ces résultats sont valides et précis.

Si vous n'avez pas réalisé une évaluation valide et précise, ces résultats ne doivent PAS être inclus dans la base de données de comparaison.

Dans tous les cas, vous recevrez un rapport automatique des résultats transmis.

- Ja
- Nee

Merci d'enregistrer vos réponses en ligne en cliquant sur l'icone "nuage" ci-dessous.